

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

LP-2-6-7239701

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION DE LA STATION DE LA RÉGION PARISIENNE

PARIS, HAUTS DE SEINE, SEINE-S&D; DENIS, VAL DE MARNE, ESSONNE, VAL D'OISE, YVELINES, SEINE ET MARNE

RÉGISSEUR RECETTES-AVANCES - D.D.A. PROTECTION DES VÉGÉTAUX, 47 Av. Paul-Doumer, (93) MONTREUIL-S-BOIS - 287 76-71

C. C. P. PARIS 9063-96

ABONNEMENT ANNUEL

25 F

BULLETIN N° 140

Supplément 2.

31 MAI 1972.

TAVELURES DU POIRIER ET DU POMMIER

CULTURES FRUITIÈRES.

Les projections d'ascospores ont nettement diminué au cours des dernières pluies et dans les tests de laboratoire; elles devraient cesser prochainement. Toutefois les risques de contamination par ascospores subsistent, la protection des arbres doit être maintenue, d'autant que les sorties de taches peuvent se poursuivre, au moins localement, jusque vers le 10 juin (pluies des 22 au 24/5).

D I V E R S.

- CARPOCAPSE DE POMMES : les premières émergences de papillons ont débuté le 25 mai. Elles sont réduites et tout traitement est actuellement inutile.
- CARPOCAPSE DES PRUNES : les premières éclosions larvaires, d'ailleurs très faibles viennent de se produire. Elles devraient devenir sensiblement plus importantes entre le 5 et le 10 juin, suivant les situations.
- ACARIENS : les pontes d'été qui ont eu lieu à partir du 20 sont parfois importantes dans certains vergers et sur certaines variétés (plus de 100 oeufs en moyenne par feuille). Parmi les autres formes, il est possible de trouver principalement des adultes. En cas de traitement il est recommandé d'utiliser :
 - un produit actif contre toutes les formes d'Acariens, c'est-à-dire parmi les produits homologués : Chlorfenethol + Chlorfensulfide, Dicofol;
 - éventuellement un "ovicide" à action stérilisante sur les femelles, compte tenu de la faible toxicité des produits de ce groupe et de la forte proportion d'oeufs : Fenizon, Tétradifon, Tétrasul;
- PSYLLES : l'activité des adultes a été très intense entre le 15 et le 25 mai. De nombreuses pontes ont été déposées. Les éclosions commencent.
- PUCERONS : les colonies deviennent plus nombreuses sur toutes espèces :
 - P. vert du Pommier, P. lanigère, P. brun du Poirier, P. noir du Cerisier, P. vert du Pêcher et surtout Pucerons cendrés sur Pommier et Poirier. Ces espèces sont très dangereuses. Le seuil de nuisibilité du P. cendré du Pommier est de 2 colonies pour 100 organes. Ce seuil semble pouvoir être admis pour les P. cendrés du Poirier, alors qu'il est par contre d'environ une dizaine pour la plupart des autres espèces. Sur les pucerons du feuillage, utiliser ou un produit spécifique comme l'Isolane ou plutôt, compte tenu de la difficulté à atteindre les colonies, un produit à action endothermique. Dans le cadre de la lutte intégrée, tenir compte des indications du bulletin n° 139 du 10 avril, pour le choix des produits.
 - HYPONOMEUTE : le nombre des foyers s'accroît.
 - MOUCHE DE LA CERISE : intervenir dès réception avec un des produits conseillés dans la liste. Tenir compte des délais d'emploi recommandés par la législation.
 - VER DES FRAMBOISES (Byturus) : les adultes sont encore présents.
 - DIDYMELLA DU FRAMBOISIER : des contaminations sont toujours à craindre.

CULTURES LEGUMIÈRES.

- MOUCHE DU CHOU : les dégâts commencent à apparaître.
- TEIGNE DU POIREAU : les attaques sont très rares.
- MOUCHE DE L'ASPERGE : nous rappelons que la protection est à assurer jusqu'au stade "ramifications épanouies".
- ANTHRACNOSE DU HARICOT : deux autres traitements au moins sont nécessaires, le premier au stade formation des boutons, le second en pleine floraison.
- MILDIOU DE L'OIGNON : les conditions climatiques sont favorables à cette maladie. Peuvent être employés : Manèbe et Mancozèbe 160 g, Propinèbe 210 g de m.a./hl. La pulvérisation pneumatique est préférable.

7281

GRANDES CULTURES.

- MELIGETHES SUR COLZA DE PRINTEMPS : les colzas sont en montaison. Les Mèligèthes sont rares. Surveiller les cultures, le stade boutons groupés étant très sensible aux attaques de Mèligèthes.
- MILDIOU DE LA POMME DE TERRE : les premières taches viennent d'apparaître sur tas de résidus de la précédente récolte. En culture, les températures basses ont été en général peu favorables à cette maladie. Toutefois, localement, les dernières pluies peuvent avoir provoqué le premier départ du Mildiou. Ce dernier ne devrait se manifester que dans des situations particulièrement favorables : végétation développée, proximité de bois, bas-fonds
Un traitement généralisé ne s'impose donc pas : il ne doit concerner que les cultures situées dans les conditions ci-dessus. Dans ce cas, une pulvérisation est à prévoir dès réception de ce bulletin.

- CONCOURS MILDIOU : la Station organise comme les années précédentes un concours pour la détection des premières taches en culture. Les échantillons adressés entre deux feuilles de buvard légèrement humides (ne pas utiliser le plastique) devront obligatoirement être accompagnés des renseignements suivants : lieu et date de l'observation, emplacement de la (ou des) tache (s) sur le pied, situation de la parcelle (plaine, bas-fonds ...) importance de l'attaque, variété, date de plantation et, si possible, de levée.

Nous remercions par avance, tous ceux, qui en répondant à ce concours, aideront la Station à localiser les premières manifestations de la maladie.

- ENNEMIS DE LA BETTERAVE : la plupart des oeufs de Pégomyie de la première série de pontes sont éclos. De nouvelles pontes, d'importance variable, ont été déposées. Dans la généralité des cas, compte tenu de la végétation, elles ne devraient pas constituer un grand danger. Surveiller néanmoins les cultures, surtout les plus tardives et celles où les pontes sont nombreuses.

Les foyers de Pucerons noirs restent peu importants.

V I G N E

- MILDIOU ET VERS DE LA GRAPPE : Prévoir un traitement dès réception.

L'Ingénieur et le Technicien
chargés des Avertissements Agricoles,

H. SIMON et R. MERLING.

Le Chef de la Circonscription
de la Région Parisienne,

R. SARRAZIN.

Dernière note : bulletin n° 140 - supplément 1 - 18 Mai 1972.

Imprimerie de la Station de la Région Parisienne - Directeur-Gérant : L. BOUYX.
47, Av. Paul Doumer 93- MONTREUIL-SOUS-BOIS.